

ABSTRAK

EVALUASI PENGGUNAAN OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT) PADA PASIEN TUBERKULOSIS PARU RAWAT JALAN DI RSUD CARUBAN PERIODE JANUARI-MARET PERIODE 2018

Diah Masrifah

362015711123

Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerasionalan pengobatan tuberkulosis paru pada pasien tubekulosis rawat jalan di RSUD Caruban periode Januari-Maret 2018 yang mengacu pada Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016. Penelitian ini termasuk jenis non eksperimental dengan rancangan deskriptif evaluatif yang pengambilan datanya bersifat retrospektif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan catatan rekam medis pasien tuberkulosis diatas 18 tahun di RSUD Caruban periode Januari-Maret 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pasien tuberkulosis terbanyak adalah pasien berjenis kelamin laki-laki (59%) dengan rentang usia 18-60 (55%), penyakit penyerta terbanyak adalah dyspepsia (42%), pengobatan sembuh (78%), pengobatan selama 6 bulan (58%). Pengobatan yang diberikan kepada pasien tuberkulosis paru rawat jalan dengan dua OAT yaitu dengan OAT kombipak dan OAT KDT, penggunaan OAT terbanyak adalah OAT Kombipak (94%) dan OAT KDT (4,5%). Penggunaan OAT berdasarkan kategori maka OAT terbanyak digunakan adalah OAT lini 1 (97%).

Kata kunci : Evaluasi Pengobatan, Tuberkulosis, Standar Pengobatan

ملخص البحث

السل هو مرض تسببه بكتيريا المتفطرة السلية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد عقلانية علاج مرض السل الرئوي لدى مرضى داء الأنايب البطني في المستشفى بتجاروبان شهر يناير إلى مارس ٢٠١٨ وهو يعتمد المبادئ التوجيهية الوطنية العام ٢٠١٦ عن إدارة مرض السل الوزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا. بأثر رجعي. أجريت الدراسة باستخدام السجلات الطبية لمرضى السل الذين تزيد أعمارهم عن ١٨ عامًا في المستشفى بتجاروبان في شهر يناير إلى مارس ٢٠١٨. وأظهرت نتائج الدراسة أن خصائص معظم مرضى السل كانوا من الرجال (٥٩٪) بعمر ١٨-٦٠ (٥٥٪) وكانت الأمراض المصاحبة الأكثر شيوعا هي عسر الهضم (٤٢٪) ، والعلاج الشفي (٧٨٪) ، والعلاج لمدة ٦ أشهر (٥٨٪). العلاج المرضى الذى يعتمد على أساس العيادات الخارجية ينقسم على قسمين من العقاقير المضادة للسل، وهما مع جرعة واحدة من الأدوية المضادة للسل ومزيج من الأدوية المضادة للدرن ثابت الجرعة، وذلك باستخدام معظم الأدوية المضادة للسل هو عقار مضاد للدرن وحيد الجرعة (٩٤٪) ثابت (٤,٥٪). استخدام العقاقير المضادة للسل على أساس الفئة ، كانت أكثر الأدوية المضادة للسل المستخدمة هي الأدوية المضادة للسل من الفئة ١ (٩٧٪).

الكلمات المفتاحية: تقييم العلاج، السل، صعيار العلاج