

ABSTRAK

Evaluasi Terapi Antibiotik Pada Pasien Diare Akut Balita Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Tentara Dr. Soedjono Magelang Tahun 2018

WAHYU KUMIL LAILA

362015712274

Diare akut merupakan buang air besar lebih dari 3 kali perhari, disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 14 hari. Terapi antibiotik merupakan salahsatu standar tatalaksana diare akut yang dianjurkan oleh WHO. Ketidaktepatan terapi antibiotik pada diare akut balita dapat menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan terapi antibiotik pada pasien diare akut balita di instalasi rawat inap Rumah Sakit Dr. Soedjono Magelang tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental yang dilakukan dengan pengumpulan data rekam medik pasien rawat inap secara retrospektif sesuai dengan kriteria inklusi dan dianalisis dengan pedoman *World Gastroenterology Organisation Acute Diarrhea in Adults and Children: A Global Perspective* 2012 dengan metode deskriptif retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 34 sampel balita dengan diagnosa diare akut dan mendapat terapi antibiotik meliputi 91% tepat indikasi, 91% tepat obat, dan 85% tepat dosis.

Kata kunci : *balita, diare akut, evaluasi, terapi antibiotik*

ملخص البحث

تحديد دقة المضادات الحيوية في المرضى الذين يعانون من الإسهال الحاد أقل من خمس سنوات في مستشفى المرضى الداخليين التثبيت الدكتور سويدجونو ماغيلانغ السنه ٢٠١٨

وحي قم الليلة

٣٦٢٠١٥٧١٢٢٧٤

الإسهال الحاد هو التغوط أكثر من ٣ مرات في اليوم ، مصحوبًا بتغيرات في تناسق البراز ليصبح سائلًا مع أو بدون مخاط ودم يدوم أقل من ١٤ يومًا. العلاج بالمضادات الحيوية هو أحد المعايير لإدارة الإسهال الحاد الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية. عدم دقة العلاج بالمضادات الحيوية في الإسهال الحاد عند الأطفال دون سن الخامسة يمكن أن يسبب الوفاة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دقة المضادات الحيوية في المرضى الذين يعانون من الإسهال الحاد أقل من خمس سنوات في مستشفى المرضى الداخليين التثبيت الدكتور سويدجونو ماغيلانغ السنه ٢٠١٨. هذا البحث هو دراسة غير تجريبية أجريت من خلال جمع بيانات السجل الطبي بأثر رجعي من المرضى الداخليين وفقا لمعايير إدراج وتحليلها من قبل المبادئ التوجيهية المنظمة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي للإسهال الحاد في البالغين والأطفال: منظور عالمي ٢٠١٢ مع طريقة وصفية بأثر رجعي ، أظهرت النتائج أنه من ٣٤ عينة من الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالإسهال الحاد المشخص وعلاجهم بالمضادات الحيوية بما في ذلك ٩١٪ من المؤشرات الصحيحة ، ٩١٪ من الدواء المناسب ، و ٨٥٪ من الجرعة المناسبة.

الكلمات الرئيسية: الأطفال الصغار ، والإسهال الحاد ، والتقييم ، والعلاج بالمضادات الحيوية